

一部のほ場で葉、果そう基部での発生が確認されています

# なし 黒星病の 予防対策をしましょう



昨年秋の発生量が多かったため、越冬菌量が多いと考えられています。  
降雨が続くと発生量がさらに増加するおそれがありますので  
昨年の発生量が多かったほ場では、特に注意しましょう。

## 防除対策

- 感染源となる発病葉や発病果を見つけたら、すみやかに園外へ持ち出し、適切に処分しましょう。
- 下記薬剤などで防除しましょう。

## 主ななし黒星病防除剤

平成25年4月24日現在

商品名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用 方法	予防	治療	系統
オキシラン水和剤	500~600倍	収穫3日前	9回以内	散布	○	×	有機塩素+有機銅
ベルコートフロアブル	1500倍	収穫14日 前	5回以内	散布	○	△	グアニジン系
アフェットフロアブル	2000倍	収穫前日	3回以内	散布	○	△	チオフェン系
ファンタジスタ顆粒水和剤	3000~4000倍	収穫前日	3回以内	散布	○	○	ベンジルカーバメート

### \*\*農薬の使用にあたって\*\*

- 薬剤の飛散防止に努めましょう。
- ラベルの表示事項を守りましょう。