


だいこん、はくさい、キャベツで ハイマダラノメイガが



平年より**やや多い状況**ですので
下記の農薬を参考に防除を心がけましょう

(育苗中や定植直後に食害されると被害が大きくなりますので
防虫ネットの設置や定植時に農薬を使用するなど、対策しましょう)



だいこん ハイマダラノメイガ登録剤

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	本剤の 使用回数	使用方法	有効成分の 総使用回数	系統
ハチハチ乳剤	1000~2000倍	14日前まで	2回以内	散布	2回以内	その他
プレバソンフロアブル5	2000倍	前日まで	3回以内	散布	3回以内	ジアミド

はくさい ハイマダラノメイガ登録剤

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前日数)	本剤の 使用回数	使用方法	有効成分の 総使用回数	系統
プリンスフロアブル	2000倍	21日前まで	2回以内	散布	3回以内(定植前 の処理は1回以 内、定植後の散 布は2回以内)	フェニルピラゾール
プレバソンフロアブル5	2000倍	前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時 までの処理は1 回以内、散布は 3回以内)	ジアミド

キャベツ ハイマダラノメイガ登録剤 ~育苗期後半(灌注)~

薬剤名	希釈倍数	使用液量	使用時期 (収穫前日数)	本剤の 使用回数	使用方法	有効成分の 総使用回数	系統
プレバソンフロアブル5	100倍	鉢成型育苗11 箱またはパター ネット1冊(約30× 60cm、使用土壌 約1.5~4L)当り 0.5L	育苗期後半~ 定植当日	1回	灌注	4回以内(定植時 までの処理は1回 以内、散布は3回 以内)	ジアミド
	500倍	苗地床1㎡当り2L					

農薬の使用にあたっては、ラベル等で確認してから使用しましょう

※情報は2013年8月28日現在の情報です。