


発生が多くみられています。

きゅうい

灰色かび病

防除を心がけましょう。



## 灰色かび病対策

1. 灰色かび病は多湿条件を好みます。  
日中のハウス内の換気も心がけましょう。
2. 灰色かび病は耐性菌がつきやすい病害ですので、  
同系統の薬剤の連用は避け、ローテーション防除を心がけましょう。  
(耐性菌の心配が少ない微生物農薬を活用するのも有効です)

## きゅうい 灰色かび病防除剤

平成22年12月22日現在

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	使用回数	予防	治療	浸透性	系統
エコショット	1000~2000倍	前日まで	一回	○	×	×	微生物農薬
ダコニール1000	1000倍	前日まで	8回以内	○	×	×	有機塩素
ポリオキシシンAL水溶剤	5000倍	前日まで	3回以内	○	○	○	抗生物質
トップジンM水和剤	1500~2000倍	前日まで	5回以内	○	○	○	ベンゾイミダゾール
ロブラール水和剤	1000~1500倍	前日まで	4回以内	○	△~○	×~△	ジカルボキシミド
フルピカフロアブル	2000~3000倍	前日まで	4回以内	○	×~△	△	アニリピリミジン

農薬の使用にあたってはラベルの表示事項を守りましょう。