


なす

(施設)

すすかび病



防除を心がけましょう。

防除のポイント

- 多湿条件で発生しやすいので、十分に換気しましょう。
- 発病葉は新たな伝染源になるので、除去しましょう。
- 薬剤防除は、下葉にも薬液が十分かかるようにていねいに散布しましょう。(病原菌は下葉にもいます)
- 同一系統の薬剤の連用は避けましょう。

主な なす すすかび病 防除薬剤

平成27年2月4日現在

薬剤名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	有効成分の 総使用回数	予防	治療	浸透性	系統
プロポーズ顆粒水和剤	1000倍	前日まで	4回まで	ベンチパリカルブ イフ®ピル: 4回以内、 TPN:4回以 内	○	○	○	有機塩素+その他
アミスター20フロアブル	2000倍	前日まで	4回まで	アジキストピル: 4回以内	○	○	○	Qoi (ストロルリ)
カンタスドライフロアブル	1000~1500倍	前日まで	3回まで	ボスナド: 3回まで	○	○	○	SDHI

- 農薬の使用前にラベルの内容を確認しましょう。
- 農薬散布後は、防除器具のタンクやホースも、洗いもれがないようにしましょう。