

過去10年と比較して
今年は発生が多い年になっています

愛知県「ナシ黒星病情報第1号」より
(平成27年6月3日)

なし 黒星病の 予防対策をしましょう



梅雨に入り、曇天雨が続くと蔓延しやすいので
今年の発生量が多かったほ場では、特に注意しましょう。

防除対策



- 感染源となる発病葉や発病果を見つけたら、すみやかに園外へ持ち出し、適切に処分しましょう。
- 下記薬剤などで防除しましょう。

主ななし黒星病防除剤

平成27年5月27日現在

商品名	希釈倍数	使用時期 (収穫前)	本剤の 使用回数	使用方法	有効成分の 総使用回数	予防	治療	系統
スコア顆粒水和剤	4000倍	14日前まで	3回以内	散布	ジフェノナゾール 3回以内	○	○	DMI
ベルコートフロアブル	1500倍	14日前まで	5回以内	散布	イミクタジン 5回以内 (塗布剤は2回以内、 液剤は1回以内)	○	△	グアニジン
フルーツセイバー	1500～3000倍	前日まで	3回以内	散布	3回以内	○	△	アニライト
ファンタジスタ顆粒水和剤	3000～4000倍	前日まで	3回以内	散布	3回以内	○	○	ベンジルカーバメート

※農薬の使用にあたって※

- 薬剤の飛散防止に努めましょう。
- ラベルの表示事項を守りましょう。

