



シロイチモジヨトウ情報

注意報が発令されました



- ◆ 一部の地点で直近1か月の総誘殺数が多い状況です。
- ◆ 今後1か月の気温は高い予報で発生量が増加する可能性があります。 （あいち病害虫情報 愛知県病害虫発生予察注意報第6号（令和7年度8月1日付）より）

●被害を防ぐために

- ・害虫の早期発見に努め、薬剤が効きやすい**若齢幼虫の内に防除**しましょう。
- ・**白変葉や網目状の葉**を発見したらすぐに防除しましょう。
- ・ほ場周辺の雑草は増殖源になるため除去しましょう。
- ・同系統の薬剤の連用は避け、異なる系統でのローテーション防除を徹底しましょう。

【ダイズに使用できる主な薬剤】

系統名	IRAC	薬剤名(例)	収穫前日数	使用回数
ピリダリル	UN*	プレオフロアブル	7日	2回
メタジアミド	30	ブロフレアSC	前日	3回

【キャベツに使用できる主な薬剤】

系統名	IRAC	薬剤名(例)	収穫前日数	使用回数
マクロライド	6	アニキ乳剤	3日	3回
ピリダリル	UN*	プレオフロアブル	7日	2回
ジアミド	28	ヨーバルフロアブル	前日	3回
①イソオキサゾリン	30	①グレース乳剤	7日	2回
②メタジアミド		②ブロフレアSC	前日	3回

※:農薬散布にあたっては、ラベルの表示内容を必ずご確認ください。

●留意点

ハスモンヨトウも増加傾向にあるため混発している場合は、ハスモンヨトウに適用のある剤での同時防除を検討しましょう。



＜シロイチモジヨトウ幼虫＞



＜シロイチモジヨトウ成虫＞