

ハスモンヨトウ情報(ダイズ・野菜類・花き類)

注意報が発令されました！

- ◆ 直近1か月の総誘殺数が複数地点でやや多い状況です。
- ◆ 今後1か月の気温は高い予報で発生量の増加が予想されます。
- ◆ 平年よりも発生が早い状況です。(あいち病害虫情報 令和7年度病害虫発生注意報第5報(8月1日付)より)

●被害を防ぐために

- ・ 老齢幼虫になると薬剤が効きづらくなります。
- ・ 卵塊や分散する前の若齢幼虫は見つけ次第捕殺し、被害葉（白変葉や網目状の葉）を発見したら**早期防除**しましょう。
- ・ ほ場周辺の雑草は増殖源になるため除去しましょう。
- ・ 施設栽培は開口部を防虫ネットで被覆し、飛び込みに注意しましょう。

【ダイズに使用できる主な薬剤】

系統名	IRAC	薬剤名(例)	収穫前日数	使用回数
ピリダリル	UN*	プレオフロアブル	7日	2回
メタジアミド	30	プロフレアSC	前日	3回
オキサジアジン	22A	トルネードエースDF	7日	2回

【キャベツに使用できる主な薬剤】

系統名	IRAC	薬剤名(例)	収穫前日数	使用回数
①イソオキサゾリン ②メタジアミド	30	①グレーシア乳剤 ②プロフレアSC	①7日 ②前日	①2回 ②3回
ジアミド	28	ヨーバルフロアブル	前日	3回
マクロライド	6	アニキ乳剤	3日	3回
オキサジアジン	22A	トルネードエースDF	7日	2回

(※1) 同一系統薬剤の連用はなるべく控えましょう。

(※2) 農薬散布に当たっては、ラベルの表示内容を必ずご確認ください。

●留意点

- ・ シロイチモジヨトウと混発して被害を及ぼす可能性があります。
- ・ ハスモンヨトウに適用のある剤でのシロイチモジヨトウやオオタバコガの同時防除も検討しましょう。



Noriyuki Miyake

<ハスモンヨトウ卵塊>



Noriyuki Miyake

<ハスモンヨトウ若齢幼虫>



Noriyuki Miyake

<ハスモンヨトウによる被害葉>